

Neurologická ambulance MUDr. Martina Kovářová

Lipová 807/14 43401 Most

Tel. 417633211

Písemný souhlas pacienta s kaudálním blokem (epidurální anestezí)

Jméno a příjmení pacienta: Rodné číslo:.....

Bydliště:.....

Kaudální blokádu provádí lékař specialista ve sterilních podmínkách s asistencí zdravotní sestry.

Provádí se jako **jedna z protibolestivých metod** ve speciálních případech u bolestí zad a dolních končetin, **často při** vícečetných výhřezech plotének, zúžení kanálu páteřního či srůstech po operacích páteře. Při tomto miniinvazivním výkonu se aplikují léky (místní anestetika či např. kortikoidy či analgetika - léky proti bolesti) do kaudálního epidurálního prostoru, tedy do oblasti páteřního kanálu vně vaku tvrdé pleny míšní a to cestou punkce kanálku (hiatus sacralis) v kosti křížové. Znečitlivující látka se rozlije okolo vaku a přeruší tak vedení nervového vzruchu z výstupu nervu z míšního vaku a to především nervů senzitivních, tedy nervů pro citlivost, dotyk.

Výkon se provádí v poloze na břiše s vypodložením této oblasti.

Nejdříve se znečtiví oblast vpichu v místě rohů kostrče na přechodu kosti křížové a kostrče lokálně znečtivující látkou 1% Mesocainem. V tomto místě se poté zavede speciální jehla (epidurální Tuohy jehla 18 G). Poté se aplikuje přetlakem větší množství znečtivující látky , zpravidla 20-30 ml 1% Mesocainu někdy spolu s kortikoidem např. Kenalogem.

Po provedení kaudální blokády budete minimálně 30 minut chodit po chodbě nebo 2 hodiny sledován na lůžku v ambulanci.

Nežádoucí účinky:

Vpich může být mírně bolestivý. Během aplikace léků můžete cítit tlakovou bolest podél páteře a dolních končetin. Můžete cítit např. teplo v zádech a v dolních končetinách, výjimečně pocit mravenčení a slabosti v dolních končetinách.

Možné komplikace a rizika výkonu:

Rizika samotného výkonu: U citlivých jedinců může několik dní přetrvávat mírná bolest v místě vpichu. Někdy dochází k mírnému snížení krevního tlaku, před a po výkonu bude Váš krevní tlak monitorován. Vyjimečně může docházet k krátkodobým problémům s močením (pocit obtížného vymočení nebo samovolný únik moči).

Nežádoucí účinky spojené s aplikovanými látkami : Někteří pacienti popisují chvilkové mírné točení hlavy, svědění kůže či nejistotu v prostoru.

Nutný doprovod druhé osoby.

Po zákroku není vhodné řídit motorové vozidlo, v den provedení výkonu je doporučován klidový režim.

Speciální příprava: Nejlépe nalačno, odpočatí.

Samotný výkon trvá cca 15 minut.

Alternativou (tedy další možností léčby) je v ambulanci bolesti prováděný epidurální obstřík, intenzivní farmakoterapie, infuzní protibolestivá terapie.

Datum a místo provedení výkonu:.....

Jméno lékaře:..... **Podpis lékaře:**.....

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že jsem byl/a lékařem srozumitelně informován/a o povaze lékařského výkonu a byl/a jsem informován/a i o možných rizicích tohoto výkonu. Měl/a jsem možnost klást lékařovi doplňující otázky a mé dotazy byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením kaudálního bloku. Všemmu jsem porozuměl/a a s navrženým postupem souhlasím. Prohlašuji, že nemám, ani jsem neměl/a alergii na Mesocain či kortikoid typu Depomedrol.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum:.....

.....

Podpis pacienta

.....

Podpis zákonného zástupce

Důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a jakým způsobem projevil svou vůli:

.....
.....
.....

